

فیبریلاسیون دهلیزی در جراحی قلب

www.ketab.ir

تألیف: دکتر علیرضا کمالی (استادیار دانشگاه)

دکتر سیدامیر صنعت کار

سبب	فیبریلاسیون دهلیزی در جراحی قلب
موضوع	دکتر علیرضا کمالی
موضوع	دکتر سید امیر صنعت کار
شناسه افزوده	انتشارات آناطاب
رده بندی کنگره	ج اول - ۱۳۹۷
رده بندی دیویی	۶۸۵RC ۱۳۹۷ ۸۹۸/۹۱
شماره کتابشناسی ملی	۵۰۸۹۹۲۲
نویسندگان	۸-۵۰-۹۸-۶۰-۷۸
قیمت	۱۲۰۰۰ تومان
این اثر مشمول قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۶۸ است. انتشار و برداری یا توزیع تمام یا قسمتی از این اثر بدون اجازه ناشر مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.	

www.anateb.net

فهرست مطالب

۵	چکیده
۱۱	مقدمه
۴۳	اهداف
۵۰	مطالعات مشابه
۵۴	سناریو مطالعه
۷۵	بحث و نتیجه گیری
۸۴	منابع

چکیده

مقدمه

شایعترین آریتمی قلبی بعد از Coronary artery bypass graft (CABG) که بیماران در ICU قلب باز، از آن رنج می برند AF می باشد. به دلیل هزینه های ادی و لزوم تجهیزات فراوان برای بیمارانی که به دنبال Coronary artery bypass graft (CABG) دچار AF شده و نیازمند بستری و مراقبت اند و همچنین وجود کنترالرسی در استفاده از نوح کلاس دارویی در درمان این آریتمی به نظر، بررسی جهت مشخص شدن درمان موثر تر و با هزینه ی مناسب تر ضروری است. اکثر رفرانس های جراحی قلب B-blocker ها و بسیاری از پزشکان و رفرانس های بیهوشی آمبودارون را جهت کنترل AF بعد از Coronary artery bypass graft (CABG)

(توصیه می کنند؛ لذا به دلیل صورت نگرفتن مطالعاتی با شواهد مکفی جهت تصمیم گیری دارویی بر آن شدیم تا اثربخشی درمانی داروهای پیشنهادی در منابع معتبر را مورد مقایسه قرار دهیم.

www.ketab.ir